A Implementação da PEP no Estado de São Paulo

Belém, novembro/2011

Denize Lotufo Estevam
Infectologista da Gerência de Assistência do Programa Estadual de DST/AIDS
Membro do Comitê Assessor para Terapia Antirretroviral em Adultos Infectados pelo HIV
Médica de Referência em Genotipagem

Oportunidades para prevenção



Cohen et al, JCI, 2008
Cohen IAS 2008

Estratégias

- I Encontro de SAE em outubro de 2010 com a apresentação do Suplemento III do Consenso com as recomendações de PEP e demais profilaxias

Estratégias

- Criação de uma Rede Única de atendimento às profilaxias pós-exposição ocupacional, sexual e violência disponibilizada no site do Programa Estadual de SP

Estratégias

- I Videoconferência sobre PEP em dezembro de 2010
- II Videoconferência sobre PEP em outubro de 2011

Estratégias

- Registro no SICLOM
- Criação de um instrumento de avaliação e seguimento
  (piloto no CRT)
- Criação de um folder para profissionais de saúde e outro para usuários

SICLOM

6 -Categoria do Usuário

- ☐ Gestante HIV +
- ☐ Recém-nascido de mãe HIV+
- ☐ Parturiente
- ☐ Aids – Adulto
- ☐ Aids – Criança

- Profilaxia Pós-exposição

- ☐ Ocupacional
- ☐ Violência Sexual
- ☐ Casais Sorodiscordantes
- ☐ Compartilhamento de seringa
- ☐ Exposição Sexual Ocasional
- ☐ Reprodução
- ☐ Outros _____

Estratégias

- Criação de um hotsite com informações detalhadas sobre PEP e acesso a Rede

- Banner para colocação nos Serviços

P E P

Profilaxia Pós Exposição

Aqui tem!

Se você viveu uma situação de risco, a camisinha se rompeu durante a relação sexual, fale conosco. A PEP é um recurso para você se prevenir do HIV/aids. Os medicamentos utilizados para evitar a infecção fazem parte do coquetel usado no tratamento da aids.

Atenção!

O uso da camisinha continua sendo o melhor meio de se prevenir das DST/HIV/aids

CRT Programa Estadual Centro de Referência e Treinamento DST/AIDS-SP

CCD Coordenadoria de Controle de Doenças

SECRETARIA DA SAÚDE

GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO

Centro de Referência e Treinamento DST/AIDS-SP

A A A Tamanho do texto

CRT DST/Aids | Estrutura | Serviços DST/Aids | Ações Programáticas | Pesquisas | Contato | Webmail | Links

PEP é uma forma de prevenção da infecção pelo HIV usando os medicamentos do coquetel utilizado no tratamento da Aids

Acesso Rápido

Onde Fazer o Teste de HIV ?
Serviços de Saúde, orientações e aconselhamento.

Disque DST - Aids
Dúvidas sobre DST/Aids?
Ligue 0800 16 25 50

Destaques

VIDEOCONFERÊNCIA PEP
Próxima Videoconferência Profilaxia Pós-Exposição Sexual Organização de Serviços e Acolhimento da População
27/10/2011

Prazos para elaboração da PAM 2012
Senhores Coordenadores de DST/AIDS dos municípios qualificados na política de incentivo, vejam os prazos para elaboração da PAM (Programação Anual de Metas) 2012.

SECRETARIA DA JUSTIÇA PROMOVE CURSO À DISTÂNCIA SOBRE CIDADANIA LGBT
Data: de 19 de outubro a 16 de novembro, Público alvo:

Agenda

Agenda de Eventos CRT

Veja todos os eventos

Atualizações

Veja as principais atualizações

http://www.saude.sp.gov.br/centro-de-referencia-e-treinamento-dstaids-sp/

Web site PEP (1)

http://www3.crt.saude.sp.gov.br/profilaxia/

Web site PEP (2)

Dúvidas mais frequentes:

Quando a PEP é indicada?

Você pode buscar a PEP em serviços de saúde credenciados depois de uma relação sexual com penetração sem camisinha com alguém que você sabe que vive com HIV ou em casos em que a camisinha rompeu ou sa durante o sexo com alguém que você não sabe se tem HIV ou não.

Se você for vítima de violência sexual (sexo não consentido) também deve procurar a rede credenciada para acessar a PEP.

Caso for profissional da saúde e sofreu algum acidente com agulhas ou outro objeto cortante contaminados este acesso também está garantido.

Quando a PEP não é indicada?

- Você já tem um resultado de teste positivo para o HIV;
- O possível contato com o vírus HIV ocorreu há mais de 72 horas;
- A relação sexual não teve penetração (como masturbação em dupla, por exemplo), mesmo que sua pele, se ferimentos, tenha entrado em contato com esperma do parceiro;
- Seu parceiro não gozou na sua boca, no caso do sexo oral;
- Há exposição repetida ao vírus, ou seja, se você faz sexo sem camisinha em várias ocasiões. Neste caso é importante procurar um CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento) ou qualquer outro serviço de saúde onde seja possível realizar o teste de HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis, como sífilis, hepatit B e C, e receber orientações sobre como se prevenir.

Onde devo ir se acredito que tive contato com com vírus do HIV?

http://www3.crt.saude.sp.gov.br/profilaxia/

Web site PEP (3)

Onde devo ir se acredito que tive contato com com vírus do HIV?

Os serviços ambulatoriais de atenção especializada em HIV e Aids (SAE) são os serviços preferenciais para o atendimento inicial. Os SAE geralmente atendem de 2ª à 6ª feira em horário comercial. Caso você necessite de atendimento em horários em que o SAE não está aberto, procure outros serviços credenciados na sua cidade ou região através da ferramenta de busca de serviços.

Caso você não tenha certeza se a situação pela qual passou oferece ou não risco de infecção para o HIV, poderá obter mais informações por meio do Disque DST/Aids - **0800 16 25 50**. Esse serviço está disponível de 2ª a 6ª feira das 8h00 às 18h00.

Somente devo procurar os serviços de referência para a PEP se eu souber que meu/minha parceiro (a) tem HIV?

Não, mesmo se você não souber que o parceiro tem HIV em alguns casos também é indicada a PEP. Por isso é importante procurar um serviço credenciado pois somente a avaliação médica definirá a indicação ou não dos medicamentos.

O uso de PEP por um mês pode ter efeitos colaterais?

Sim, pode haver alguns, que variam de pessoa para pessoa. Durante a consulta, o médico irá informá-lo sobre os possíveis efeitos colaterais e os serviços de saúde que você poderá procurar caso sinta algum deles. Normalmente os efeitos colaterais são leves e de fácil controle.

Se eu sentir um efeito colateral, devo/ posso abandonar o tratamento?

Você não deve abandonar o tratamento! Deve ir imediatamente ao serviço de saúde que receitou o tratamento para contar o que está sentindo. É possível trocar os medicamentos. Lembre-se, os efeitos colaterais esperados, normalmente são leves e de fácil controle. Fique atento pois completar o tratamento por 28 dias é fundamental para a prevenção da infecção pelo HIV.

http://www3.crt.saude.sp.gov.br/profilaxia/

Web site PEP (4)

Se eu sentir um efeito colateral, devo/ posso abandonar o tratamento?

Você não deve abandonar o tratamento! Deve ir imediatamente ao serviço de saúde que receitou o tratamento para contar o que está sentindo. É possível trocar os medicamentos. Lembre-se, os efeitos colaterais esperados, normalmente são leves e de fácil controle. Fique atento pois completar o tratamento por 28 dias é fundamental para a prevenção da infecção pelo HIV.

Serei bem recebido na rede de serviços de referência para PEP?

Como ocorre, muitas vezes, há todos os tipos de acolhimento. Você deve insistir em que seu caso é de URGÊNCIA e que precisa passar por uma avaliação médica imediatamente! Caso a profilaxia seja indicada, o ideal é começar nas duas horas seguintes à exposição ao vírus e no máximo até 72 horas após. A demora no atendimento pode ser a diferença entre se infectar com HIV ou NÃO!

Se eu estiver tomando os medicamentos da PEP estarei protegido de futuras infecções pelo HIV?

Não! Você deve continuar se prevenindo da infecção pelo HIV e também de outras doenças sexualmente transmissíveis (DST) como sífilis, gonorréia, HPV, entre outras, utilizando preservativos em suas relações sexuais.

CRT Programa Estadual Centro de Referência e Treinamento DST/AIDS-SP

CCD Coordenadoria de Controle de Doenças

SECRETARIA DA SAÚDE

GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO

http://www3.crt.saude.sp.gov.br/profilaxia/

Web site PEP (5)

http://www3.crt.saude.sp.gov.br/profilaxia/

1 - Nucleo de Ambulatorio Especializado do Centro de Referencia e Treinamento em DST/Aids- Sao Paulo

Mostrar Detalhes | Ocultar Detalhes

Nome: Nucleo de Ambulatorio Especializado do Centro de Referencia e Treinamento em DST/Aids- Sao Paulo
Endereço: RUA SANTA CRUZ, 81
Bairro: VILA MARIANA
CEP: 04121-000
CNES: 2077957
GVE: Sao Paulo
Município: Sao Paulo
Horário de Atendimento: das 08:00 até as 20:30
Telefone: (11) 5087-9911
E-mail: ambulatorio@crt.saude.sp.gov.br
Modalidades que o serviço oferece:
Exposição Ocupacional: sim
Exposição Sexual: sim
Violência Sexual: sim
O Local realiza o primeiro atendimento: sim
O Local faz acompanhamento após o 1o atendimento: sim
Observações:

Imprimir

Web site PEP (6)

http://www3.crt.saude.sp.gov.br/profilaxia/

Web site PEP (7)

http://www3.crt.saude.sp.gov.br/profilaxia/

Links úteis

- Profilaxia Pós Exposição
  - Causes 101 – Apoiadores:
    http://www.causes.com/causes/625560-acesso-a-pep-profilaxia-p-s-exposi-o-preven-o
  - Facebook:
    http://www.facebook.com/#!/crtdstaidssp
  - Página CRT DST/Aids:
    www3.crt.saude.sp.gov.br/profilaxia
  - Disque DST/Aids: 0800 16 25 50
    disque-dstaids@crt.saude.sp.gov.br

VIDEOCONFERÊNCIA - PEP

PEP
Profilaxia Pós Exposição

+ Selecionar convidados

18 confirmaram presença Ver todos

Célia Takamura

Luiz André Sousa Moresi

Camila Rodrigues

Marcia Santos

Márcia Giovanetti

Joana Leite

Maria Clara Gianna

Karina Wolffenbuttel

6 talvez participarão Exibir



Videoconferência PEP - Profilaxia Pós Exposição Sexual

Editar evento | Mensagens para convidados

Você Presente · Compartilhar · Evento público

Hora	quinta, 27 de Outubro · 09:00 - 12:00
Localização	Pólos das DRS em todo o Estado de São Paulo
Criado por	Crtdstaidssp Crtaids
Mais informações	PEP - Profilaxia Pós Exposição Organização de serviços e acolhimento da população Acompanhe Também pela Internet pelo Link http://media.escolasdegoverno.sp.gov.br/crt (Este Llink é ativado somento no horário da Videoconferência) Conheça o Site específico da PEP: http://www3.crt.saude.sp.gov.br/profilaxia/hotsite/ Esta videoconferência têm como principal objetivo, apresentar as informações sobre o estado atual da Rede de serviços de DST/aids que realizam a Profilaxia Pós Exposição Sexual. Além de divulgar a rede a população e favocerer a Visibilidade sobre a importância da organização dos serviços para atendimento da população Em 2010 - Realizamos uma Vidoeconferência sobre a PEP com foco mais nos aspectos Clinicos. Atualização: Profilaxia Pós Exposição Sexual ao HIV 10/12/2010

Solicitações de amizade Ver todas

Andréia Fernandes
14 amigos em comum
Confirmar amizade

Liorcino Leo Mendes
62 amigos em comum
Confirmar amizade

Patrocinado Criar um anúncio

Verão: Depilação a Laser

Oferta Única, De R$ 1.200 p/ 3x de R$ 67,00: 10 sessões de Depilação a Laser na Espaço Laser, 10 unidades à sua escolha.

Biquínis Até 70% OFF
convite.privalia.com

Aproveite o sol em alto estilo com biquínis até 70% Off na Privalia. Veja!

Processo Seletivo FMU

Em 2012, estude com a

Bate-papo - (31)

Atendimento no CRT-DST/Aids

- Entrada pelo CTA
- Atendimento priorizado
- Equipe Psicossocial - Acolhimento
- Oferta do teste rápido para HIV
- Sorologias para hepatite B,C e sífilis
- Seguimento no ambulatório de HIV

Fluxo de atendimento - CRT



Fluxo no CRT

- Libera-se medicamento para 10 dias
- Retorno no ambulatório de 1 semana a 10 dias para verificar efeitos colaterais e evitar abandono de tratamento.
- Reforçar orientação sobre possíveis efeitos colaterais e conduta

Importante

- Os medicamentos devem estar no serviço para que a 1ª dose seja tomada na mesma hora.
- Os serviços podem se cadastrar para receber ARV como ocorre nas maternidades e PS
- Encaminhamento para acompanhamento pelo SAE

Dados retirados do SICLOM SP até agosto de 2011

Ano	Tipo de exposição	Nº de Dispensas
2010	Casais sorodiscordantes	175
	Sexual ocasional	76
2011	Casais sorodiscordantes	138
	Sexual ocasional	294

dlotufo@crt.saude.sp.gov.br